

ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИЧИН СМЕРТИ
ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
ВО ВСЕМ МИРЕ

КОРЬ

возбудитель инфекции - вирус



ЗАЩИТИ РЕБЕНКА ОТ КОРИ!

Управление Роспотребнадзора по г.Геленджику,
«горячая линия» Новороссийский филиал ФБУЗ
«Центр Гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
8 (86141) 3-22-14, 5-75-07
E-mail: bses-nvrsk@mail.ru

1

Корь – одна из
самых заразных
детских вирусных
инфекций

90% людей, не имеющих иммунной
защиты против кори, находясь
рядом с больным заразятся

Осложнения кори:

- отит,
- слепота,
- пневмония,
- синдром крупы,
- энцефалит (отек головного мозга),
- может усугубить течение туберкулеза



Вакцинация

единственная эффективная
и длительная защита ребенка
от инфекции кори

95%



случаев – формируется
иммунитет после двукратного
введения вакцины

Первые симптомы

через 8-12 дней после заражения



- лихорадка
- кашель
- насморк
- конъюктивит

2-3

Через 2-3 дня
на слизистой
оболочке щек
появляются
крошечные
белые пятна
окруженные
каймой (пятна
Филатова–
Коплика).



Защищает от кори
комбинированная
вакцина от трех
заболеваний: корь,
паротит, краснуха.

В России вакцинация против кори проводится
в соответствии с Национальным календарем
профилактических прививок, ДЕТЬЯМ в 1 год и в 6
лет, ВЗРОСЛЫМ также в 2 этапа через 3 месяца.

Вакцинация проводится в прививочных
кабинетах

БЕСПЛАТНО!



Корь - одна из самых заразных детских вирусных инфекций, которая нередко приводит к смерти или инвалидности детей.

Причиной большинства смертельных случаев становится осложнения кори, которые чаще всего развиваются у детей до 5 лет и у взрослых старше 20 лет.

Возбудитель инфекции – вирус.

Инфекция передается воздушно-капельным путем во время разговора, чихания и кашля. Вирус содержится в капельках слюны и слизи.

90% людей, не имеющих иммунной защиты против кори, находясь рядом с больным заразятся.

Входные ворота инфекции - слизистые оболочки верхних дыхательных путей. Далее вирус разносится кровью по всему организму.

Симптомы кори появляются через 7-14 дней после инфицирования человека.

Первые симптомы

- лихорадка
- кашель
- насморк
- конъюнктивит

Через 2 или 3 дня на слизистой оболочке щек появляются крошечные белые пятна окруженные каймой (пятна Филатова-Коплика).

Через 3-5 дней после появления первых симптомов появляется сыпь. Обычно она начинается с плоских красных пятен, которые появляются на лице у волос и распространяются вниз до шеи, туловища, рук и ног. В момент появления сыпи, лихорадка может достигать 39°C.

Через несколько дней, в среднем это 3-4 дня, лихорадка спадает, сыпь исчезает.

Среди осложнений кори - пневмония, синдром крупка, энцефалит (отек головного мозга), слепота, отит. Корь может усугубить течение туберкулеза.

Болеют корью и дети и взрослые. Наиболее тяжело корь протекает у ослабленных детей и у детей с иммунодефицитными состояниями.

После перенесенной кори формируется пожизненный иммунитет (невосприимчивость) к повторному заражению.

Профилактика кори

Единственной эффективной и длительной защитой ребенка от кори является вакцинация.

Защитить ребенка можно с помощью комбинированной вакцины, которая защищает от трех заболеваний: корь, паротит, краснуха.

В России вакцинация против кори проводится в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. Вакцинация проводится в прививочных кабинетах бесплатно.

Прививка делается детям в возрасте 1 года и в 6 лет. Если прививка не была проведена вовремя или если нет информации о прививках, то она проводится взрослым также в 2 этапа с разницей в 3 месяца.

Вакцина против кори безопасна и эффективна.



ЗАЩИТИТЬ РЕБЕНКА ОТ КОРИ - ВАШ РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОЛГ!